

Sortenbeschreibung LSV sehr frühe Speisesorten 2007

nach BSA Liste 2007; holl. Liste 2003, angepaßt¹⁾; Züchterangaben²⁾ und eigene Beobachtungen³⁾

Sorte	Reifezeit	Kochtyp	Knollenform	Fleisfarbe	Anfälligkeit für:				Neigung zu:				Keimfreudigkeit	* Übergrößen	* Untergrößen
					Y-Virus	Krautfäule	Knollenfäule	Schorf	Ziewuchs	Hohlherzigkeit	Wachsrisse	Schwarzfleckigkeit			
1 Berber	2	vf	oval	hellgelb	9	6	3	5	4	4	4	4	6	5/6	5/4
2 Solist	1	vf	rundoval	hellgelb	5	6	3	3	3	4	3	2	4	6/6	5/5
3 Leyla	1	vf	langoval	tiefgelb	4	6	4	6	4	3	4	2	3	4/5	3/3
4 Valetta	1	vf	langoval	gelb	7	6	4	3	4	3	3	2	4	6/6	3/3
5 Anuschka ^{2;3)}	2	f	oval	gelb	-	6	3	5	3	3	3	3	3	5	3
6 Saline ^{2;3)}	1	vf	oval	hellgelb	-	5	4	3	3	3	3	3	4	4/5	5/4
7 Verona ²⁾	1	vf	oval	hellgelb	-	6	4	4	-	3	3	3	4	5/5	4/4
8 Presto	2	vf	oval	gelb	1	5	3	5	3	3	3	3	6	4/5	5/4
9 Annabelle ^{2;3)}	2/3	f	lang	dunkelgelb	4	6	3	5	4	3	3	3	6	5	6
10 Agila	3	f	langoval	hellgelb	2	5	4	4	5	3	3	1	4	7	2

f = festkochend; vf = vorwiegend festkochend;

1 = sehr gering, sehr niedrig

3 = gering, niedrig

5 = mittel

7 = stark, hoch

* Frührodung/Spätrodung

LSV sehr frühe Speisekartoffeln 2007

Mittel der Standorte Buir und Waldniel

Sorte	Stärke%	Sortierung			Ertrag		Marktwareertrag > 35 mm			
		< 35 mm	35-60	>60 mm	dt/ha	rel.	dt/ha 2007	rel. 2007	rel. 2006	rel. 2005
1 Berber	12,1	2	42	57	581	103	572	102	100	106
2 Solist	10,4	0	35	64	558	99	556	99	86	-
3 Leyla	11,7	1	57	42	524	93	519	93	106	98
4 Valetta	10,3	1	60	39	523	92	517	92	109	109
5 Anuschka	10,5	1	52	47	583	103	579	103	111	-
6 Saline	12,2	1	61	38	533	94	529	94	106	100
7 Verona	11,8	1	52	47	572	101	567	101	111	-
8 Presto	11,3	1	50	50	638	113	633	113	-	-
9 Annabelle	10,2	1	72	27	569	100	561	100	-	-
10 Agila	11,3	1	48	51	581	103	575	103	-	-
	11,2	1	53	46	566	100	561	100	100= 422 dt/ha	100= 477 dt/ha